

Mode d'emploi du médicament SYNTHOL liquide

Dans quel cas le médicament SYNTHOL liquide est-il prescrit ?

Cette solution d'usage local calme les douleurs, décongestionne et désinfecte.

Elle est utilisée dans le traitement d'appoint :

- des piqûres d'insectes ;
- des ecchymoses (bleus) et des coups ;
- des affections de la bouche : gingivite, stomatite, aphtes, douleurs dentaires...

Présentations du médicament SYNTHOL liquide

SYNTHOL liquide : solution pour application cutanée et bain de bouche ; flacon de 75 ml

SYNTHOL liquide : solution pour application cutanée et bain de bouche ; flacon de 225 ml

SYNTHOL liquide : solution pour application cutanée et bain de bouche ; flacon de 450 ml

Composition du médicament SYNTHOL liquide

	p 100 g
Lévomenthol	260 mg
Vératrol	260 mg
Résorcinol	21 mg
Acide salicylique	10,5 mg
Titre alcoolique	34,5 °

Substances actives : Acide salicylique, Lévomenthol, Résorcine, Vératrol

Excipients : Cèdrat essence, Eau purifiée, Éthanol à 96 %, Géranium essence, Jaune de quinoléine

Contre-indications du médicament SYNTHOL liquide

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux salicylés ;
- enfant ayant des antécédents de convulsions ;
- en application sur une plaie, une lésion suintante ou infectée, un eczéma.

Attention

Ce médicament contient un terpène (menthol) qui peut, dans de très rares cas, provoquer des accidents graves chez le jeune enfant (convulsions...). Il ne doit être employé qu'après avis médical chez les enfants de moins de 7 ans. Le risque est accru en cas d'application sur des surfaces étendues ou en cas d'épilepsie.

Dans le traitement des affections buccales, l'usage prolongé de ce médicament n'est pas souhaitable, car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche ; en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin ou votre dentiste.

Fertilité, grossesse et allaitement

Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées par la peau. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mode d'emploi et posologie du médicament SYNTHOL liquide

Dans les affections de la bouche, la solution s'utilise en bain de bouche : diluer 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau.

Dans les autres cas, la solution s'utilise :

- pure, en frictions ;
- diluée, en compresse : imbiber une compresse de solution diluée à 50 % avec de l'eau, puis

l'appliquer pendant 1/2 heure à 1 heure sur la région douloureuse.

Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 7 ans : 2 ou 3 bains de bouche ou applications locales par jour.
-

Conseils

Pensez à vous laver les mains après l'application. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de la lumière.

Effets indésirables possibles du médicament SYNTHOL liquide

Réaction allergique locale.

En cas de dépassement de la posologie usuelle, les terpènes peuvent provoquer :

- des convulsions chez l'enfant,
- agitation, confusion des idées (notamment chez la personne âgée).

La présence d'alcool peut favoriser le dessèchement et l'irritation de la peau, surtout en cas d'applications répétées.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.



Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02

Fax 05.63.38.96.10

pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.